

Diagnose en behandeling patiënt

Diagnostische fase SEH



Behandelfase Fractuurpreventiepoli

Geen afwijkingen

Brief huisarts
Normaal:
- Leefstijladvies
- Event. advies
Ca. suppletie

Tijdens poli-bezoek: Beoordeling medicus

Osteoporose

Lab:
Albumine, Alk. Fosf.
Ca., Creat., BSE,
Hb., Leuco,
TSH., Vit. D3 25OH

Besluitvorming
behandeling zn:
Bisfosfonaat, Ca., Vit. D.,
aanvullend advies
conform
NHG standaard
CBO richtlijn

Start behandeling
met een
Bisfosfonaat

Brief huisarts
Osteoporose
met behandelafpraak

Osteopenie

Lab:
Albumine, Alk. Fosf.
Ca., Creat., BSE,
Hb., Leuco,
TSH., Vit. D3 25OH

Besluitvorming
-1,0 < T-score < -2,0
behandeling zn:
Ca, Vit. D.,
-2,0 < T-score < -2,5
Start Bisfosfonaat
Event. Ca. en Vit. D
aanvullend advies
conform CBO richtlijn

Afhankelijk van
T-waarde
Uitslag DEXA scan
event. start behandeling
met een Bisfosfonaat

Brief huisarts
Osteopenie
met behandelafpraak

Controle Creatinine en GFR
voor start behandeling met
een Bisfosfonaat bij
vermoeden van
nierfunctiestoornis.
Vitamine D. suppletie en
event. Ca. starten.

Behandeling met een
Bisfosfonaat: Conform
CBO richtlijn NHG standaard
bij uitvoering door huisarts.

Follow-up fase

Huisarts



Follow-up/controles via
Servicecentrum
Conform NHG standaard,
Schema zie pag. 5 RTA.

Evaluatie bij 2 – 3 jaar
Eventueel herhalen Dexa scan
Check therapiebrouw.

Na vijf jaar eindevaluatie,
Dexa scan herhalen
In principe stoppen medicatie