

# Nierfunctie verlies

Directe consequenties voor de praktijk

# Casus

- ▶ Dhr C, 55 jaar, bekend met DM, hypertensie
- ▶ Nu jicht
- ▶ Wilt graag diclofenac, hielp eerder ook goed
- ▶ Nierfunctie MDRD 50
- ▶ Start met advies na 4 dgn klaring mdrd te prikken- daling dan naar 42 !
- ▶ U belt: Direct stoppen
- ▶ Alternatieven:
  - Prednisolon?
  - Colchicine?



# Casus

- ▶ Mevrouw H, 80 jaar, UWI recidief trimetroprim eerder geen baat
  - MDRD? Niet bekend
  - U schrijft nitrofurantoinen voor
  - 2 dagen later : Patiënte ziek, braken, suf
  - Geen koorts, tracti niet bijdragend
  - Ingestuurd geriatrie:
    - Klaring 8- spoeddialyse
    - Bekend bij internist ander zh met klaring 25 echter al 3 jaar geen brief en laatste bekende waarde dossier 40

# Nierfunctie in de dagpraktijk

- ▶ Top 20 diagnoses in de huisartsenpraktijk
  - 1. Hypertensie
  - 2. Diabetes
  - 3. Urineweginfecties
  - 16–19 Bewegingsapparaat



# Nierfunctie in de dagpraktijk

- ▶ Top 20 diagnoses in de huisartsenpraktijk
  - 1. Hypertensie
    - Diureticum, Ace-remmer
  - 2. Diabetes mellitus
    - Metformine, Su-derivaat, insulines
  - 3. Urineweginfecties
    - Nitrofurantoïne, trimetroprim, amoxicilline/clavulaanzuur
  - 16–19 bewegingsapparaat
    - Paracetamol, NSAID, zwak opoiden

# Nierfunctie in de dagpraktijk

- ▶ Top 10 diagnoses in de huisartsenpraktijk
  - Hypertensie
    - Diureticum, Ace-remmer
  - Diabetes mellitus
    - Metformine, Su-derivaat, insulines
  - Urineweginfecties
    - Nitrofurantoinen, trimetroprim, amoxicilline/clavulaanzuur
  - 16–19 bewegingsapparaat
    - Paracetamol, NSAID, zwak opoiden

# Vragen voor aan tafel

- ▶ Heeft uw assistente een protocol UWI?
- ▶ Checkt u de nierfunctie voor u een krabbel zet onder het recept nitrofurantoin?

