

Relevante telefoonnummers en medicatietabellen voor palliatieve zorg

Telefoonnummers

Consultatie Team Palliatieve Zorg (alle dagen per week van 08.00 uur - 20.00 uur)	0900 - 297 16 16
VTT team, ZuidZorg	040 - 230 84 08
VTT team, de Zorgboog	0900 - 899 86 36
VTT team, Savant Zorg	0492 - 57 20 00
Centrale dienstapotheek Eindhoven	040 - 243 66 66
Apotheek de Run, Veldhoven (dagelijks open tot 23.00 uur)	040 - 888 90 35
Dienstapotheek Peelland	0492 - 43 29 06
AnnApotheek Geldrop (dagelijks open tot 21.00 uur)	040 - 286 48 70
Acute palliatieve unit MMC Veldhoven	040 - 888 93 26 /93 20
Geestelijke verzorging in de eerste lijn (project 2011) (vragen naar dienstdoende geestelijk verzorger)	040 - 888 8000
Tefa-Portanje (leverancier voor infuuspompen)	0348 - 49 58 70
Farmadomo (leverancier voor infuuspompen)	088 - 327 62 76

Opioïde pijnstillers

Opioïd	Langwerkend	Kortwerkend
Oxycodone	OxyContin (oraal)	OxyNorm (oraal) Oxycodon parenteraal Oxycodon drank
Oxycodone / naloxon	Targinact (oraal)	
Morfine	MS Contin (oraal) Kapanol (oraal) Morfine retard (oraal)	Oramorph (drank) Morfine parenteraal Morfine drank Morfine supp
Fentanyl	Fentanyl pleister Durogesic pleister	Actiq (zuigtablet/ lolly) Fentanyl parenteraal Instanyl neusspray
Hydromorfon	Palladon-SR (oraal)	Palladon-IR (oraal)
Buprenorphine	Transtec pleister	Temgesic (sublinguaal) Buprenorphine parenteraal

Mogelijke combinaties van medicijnen in een spuit voor subcutane toediening

Morfine	Butylscopolamine	Haloperidol	Zo nodig aanvullen met steriel water
Morfine	Butylscopolamine	Midazolam	Zo nodig aanvullen met steriel water
Morfine	Butylscopolamine	Octreotide	Zo nodig aanvullen met steriel water
Morfine	Haloperidol	Clonazepam	Zo nodig aanvullen met steriel water
Morfine	Haloperidol	Octreotide	Zo nodig aanvullen met steriel water
Morfine	Levomepromazine	Octreotide	Zo nodig aanvullen met steriel water
Morfine	Metoclopramide	Clonazepam	Zo nodig aanvullen met steriel water
Morfine	Metoclopramide	Haloperidol	Zo nodig aanvullen met steriel water
Morfine	Metoclopramide	Levomepromazine	Zo nodig aanvullen met fysiologisch zout
Morfine	Metoclopramide	Midazolam	Zo nodig aanvullen met steriel water
Morfine	Metoclopramide	Octreotide	Zo nodig aanvullen met steriel water
Morfine	Midazolam	Levomepromazine	Zo nodig aanvullen met steriel water of fysiologisch zout
Morfine	Midazolam	Haloperidol	Zo nodig aanvullen met steriel water
Morfine	Midazolam	Octreotide	Zo nodig aanvullen met steriel water

Dexamethason 1 x daags 's morgens subcutaan, niet combineren in de pomp!

Let op: combinaties altijd nog inspecteren op neerslag. Bij neerslag niet verenigbaar.

Omreken tabel medicatie oraal naar equivalente subcutane dosering

	Oraal	Subcutaan
Dexamethason	1 mg	1 mg
Haloperidol	2,5 mg	1,5 mg
Metoclopramide	10 mg	6 - 10 mg
Midazolam	1 mg	0,5 mg
Levomepromazine	25 mg	12,5 mg



Indicatie veelgebruikte medicamenten in de palliatief terminale fase

MEDICAMENT	PALLIATIEF TERMINAAL - indicatie	DOSERING - subcutaan per 24 uur
Morfine 10 mg = 1 ml 100 mg = 5 ml	- pijn - dyspnoe	30 mg 15 mg, bovengrens afhankelijk van bijwerkingen. Altijd laxeren
Butylscopolamine (Buscopan®) 20 mg = 1 ml	- spasmen van de darmen, galwegen en urinewegen - reutelen	60 - 200 mg 20 - 40 mg
Clonazepam (Rivotril®) 1 mg = 2 ml	- convulsies - spierkrampen - neuropatische pijn	1 - 8 mg sedatief
Dexamethason 5 mg = 1 ml	- inflammatoir oedeem ten gevolge van tumor - verhoogde intracranieële druk - anorexie/cachexie - misselijkheid/braken - pijn ten gevolge van zenuwcompressie - botpijn als co-medicatie	5 - 20 mg 2,5 mg - 7,5 mg
Haloperidol (Haldol®) 5 mg = 1 ml	- verwardheid, delier - misselijkheid en braken	5 - 10 mg 2 - 4 mg
Levomepromazine (Nozinan®) 25 mg = 1 ml	- misselijkheid en braken - palliatieve sedatie bij midazolam	3,25 - 12,5 mg 25 - 200 mg
Metoclopramide (Primperan®) 10 mg = 2 ml	- misselijkheid en braken - hik (prokinetische werking)	40 - 120 mg
Midazolam (Dormicum®) 5 mg = 1 ml 15 mg = 3 ml	- angst - delier (bij haloperidol) - palliatieve sedatie	15 - 30 mg 30 - 480 mg
Octreotide 0,1 mg = 1 ml 0,2 mg = 1 ml 0,5 mg = 1 ml	- braken bij (sub)ileus (remt de gastro-intestinale secretie)	300 - 900 microgram
Ondansetron (Zofran®) 4 mg = 2 ml 8 mg = 4 ml	- braken ten gevolge van chemotherapie - pruritus ten gevolge van opioïden	4 - 16 mg

Omreken tabel opioïden (1)

MORFINE oraal	MORFINE subcutaan/iv	FENTANYL transdermaal	OXYCODON oraal	OXYCODON subcutaan/iv	OXYCODON naloxon oraal	HYDRO-MORFON oraal	Buprenorfine transdermaal	Buprenorfine sublinguaal	Tramadol oraal
mg/24 uur	mg/24 uur	mcg/ uur	mg/24 uur	mg/24 uur	mg/24 uur	mg/24 uur	mcg/uur	mg/24 uur	mg/24 uur
30	10	12	15	7,5	15/7,5		17,5 (2)	0,4	150
60	20	25	30	15	30/15	8	35	0,8	300
120	40	50	60	30	60/30	16	70	1,6	
180	60	75	90	45		24	105	2,4	
240	80	100	120	60		32	140	3,2	
360	120	150	180	90		48	- (3)		
480	160	200	240	120		64			

(1) Bij opioïdrotatie vanwege bijwerkingen wordt geadviseerd om 75% van de equi-analgetische dosis te geven, bij opioïdrotatie vanwege onvoldoende effect wordt de equi-analgetische dosis geadviseerd.
(1a) Voor doorbraakpijn per keer 10 - 15% van de dagdosering. (2) Hlevor wordt de buprenorfinepleister van 35 mcg/uur doormidden geknipt. (3) Hogere doseringen dan 140 mcg/uur worden niet geadviseerd.