

## Bijlage 2 De Rivermead Post-Concussion Symptoms Questionnaire (NL) Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant

Na een hersenschudding of een ongeluk ervaren sommige mensen klachten die hinderlijk en invaliderend zijn. We willen graag weten of u last heeft van een van de klachten hieronder. Geef bij elke klacht aan welk cijfer het beste bij u past.

- 0= helemaal niet ervaren als een probleem
- 1= inmiddels geen probleem meer
- 2= een klein probleem
- 3= een probleem
- 4= een groot probleem

Vergeleken met voor het ongeluk, hebt u nu (de laatste 24 uur) last van... ..

Hoofdpijn	0	1	2	3	4
Duizeligheid	0	1	2	3	4
Misselijkheid of overgeven	0	1	2	3	4
Overgevoeligheid voor geluid	0	1	2	3	4
Slecht slapen	0	1	2	3	4
Versnelde vermoeidheid	0	1	2	3	4
Versnelde boosheid of irritatie	0	1	2	3	4
Somberheid of verdriet	0	1	2	3	4
Frustratie of ongeduld	0	1	2	3	4
Vergeetachtigheid of geheugenverlies	0	1	2	3	4
Concentratieverlies	0	1	2	3	4
Trage denksnelheid	0	1	2	3	4
Wazig zien	0	1	2	3	4
Overgevoeligheid voor licht	0	1	2	3	4
Dubbelzien	0	1	2	3	4
Rusteloosheid	0	1	2	3	4

Hebt u last van andere klachten.....

	0	1	2	3	4
	0	1	2	3	4

Een veel gebruikt afkappunt<sup>1</sup> is: 3 of meer items met een score van 2 of hoger duidt op PCS.

<sup>1</sup> In de literatuur worden regelmatig hogere waardes aangehouden, zie referentie in het artikel in Brain Injury 30(5-6):770 met bijbehorende sensitiviteit en specificiteit. Een onderzoek om te komen een gevalideerd afkappunt van de vragenlijst Rivermead Post Concussion Symptoms Questionnaire (RPQ)